

Uit de Jaarstatistieken CRV 2024-2025

De gemiddelde productiegegevens per bedrijf en per ras worden ieder jaar in september berekend en in oktober gepubliceerd. Daarnaast werden in april statistieken opgemaakt en gepubliceerd met aantallen geboren kalveren en aantallen inseminaties. CRV publiceert het totaaldocument Jaarstatistieken ieder jaar in februari/maart op haar website. De cijfers van inseminaties en kalveren treft u hieronder aan (terwijl het lopende boekjaar 2025-2026 tot september loopt). Voor zover het om blaarkopgegevens in de Jaarstatistieken gaat, hebben we die er uitgelicht.

Geboren kalveren: 1 september 2024 - 31 augustus 2025:

Rasgroep (62,5% -100%G)	Stamboek			Niet-stamboek		
	vrl	mnf	v+m	vrl	mnf	v+m
Blaarkop Zwart	1.645 (+257)	1.407 (+298)	3.052 (+555)	154 (- 7)	401 (-61)	555 (-68)
Blaarkop Rood	834 (+ 85)	698 (+ 87)	1.532 (+172)	139 (+17)	338 (+70)	477 (+87)
Totaal Blaarkop:	2.479 (+342)	2.105 (+385)	4.584 (+727)	293 (+10)	739 (+ 9)	1.032 (+19)

Conclusie: totaal aantal geregistreerde vrouwelijke kalveren met tenminste 62,5%G: 2772 (+ 352 stuks)

Dit betreft kalveren waarvan zowel de vader als de moeder 'bekend' is, immers als de vader geheel 'onbekend' is (d.w.z. dat de dekking niet is geregistreerd), dan is tenminste 50% van het ras 'onbekend' en dus vallen die dieren niet in de rasgroep >62,5% Blaarkop. Het aantal vrouwelijke stamboekkalveren steeg met maar liefst 342 stuks; een stijging van 11,6% (de voorgaande 2 jaren ruim 6%). Het totaal aantal geregistreerde blaarkopkalveren met tenminste 62,5%G is 5616. Ruim 89% van de geregistreerde vrouwelijke kalveren is stamboek; in het voorgaande jaar was dat ruim 88%. Toen was het aantal geregistreerde vrouwelijke stamboekkalveren ook al met 118 stuks gestegen. Er is de laatste jaren een gestage toename van het aantal stamboekkalveren, met name ten gunste van het aantal zwartblaren. Met deze toename van het aantal stamboekkalveren wordt de fokpopulatie van het ras vergroot.

De Stamboekregistratie op orde: de conclusie kan zijn dat steeds meer veehouders de Stamboekregistratie goed op orde hebben. Een goede / betere registratie van dekkingen is van groot belang voor het behoud van de populatie, maar ook voor de veehouders met betrekking tot de **premiregeling** voor zeldzame rassen; die vanaf 2023 geldt per aantal 'gevlagde' GVE's (runderen met tenminste 87%G)(dieren < 2 jr tellen voor een deel van een GVE) op bedrijven die zich hebben aangemeld voor het Paraplubestand.

Het aantal de 'levende' vrouwelijke stamboekdieren per ras bij CRV (>87%G) per 1-9-2025 :

Het aantal Blaarkop Zwart: 1550(1582) Het aantal Blaarkop Rood: 1530(1512) Totaal: 3082 Dat is -12 stuks t.o.v. 1-9-2024. T.o.v. 2020 (3134): is het aantal vrouwelijke stamboek blaarkoppen (>87%G) met 3,2% gedaald; ter vergelijking MRIJ: - 22,5%. De door CRV gepubliceerde aantallen over voorgaande jaren wijken af van wat een jaar eerder in de CRV Jaarstatistieken vermeld stond. De betreffende aantallen levende dieren werden in de Jaarstatistieken van 2023-2024 voor het eerst vermeld.

Dat blaarkoppen in toenemende mate ook als zoogkoe en/of voor natuurbeheer benut worden zal mede van invloed zijn op de relatief geringere daling dan waarvan met name sprake is bij MRIJ. En, de zoogkoeienhouders hebben ook de stamboekregistratie steeds beter op orde. Naast bij CRV zijn er bij het FHRS ca. 150 à 200 levende vrouwelijke blaarkop stamboekdieren geregistreerd.

De 3 blaarkopstieren (met tenminste 87%G) met de meeste stamboekkalveren (incl. kruislingen) per rasgroep in 2024 - 2025:

Ande Niedijk Knot (rood)	218 vrl	202 mnf	420 v+m
Rivierduin Ebels Han (rood)	217 vrl	202 mnf	419 v+m
Widar (zwart)	180 vrl	188 mnf	368 v+m

De tellingen per stier bevatten ook kruislingkalveren. De aantallen kalveren per deze drie stieren is geringer dan van de top-3 in vorig boekjaar. Dat duidt in het geheel op wat meer spreiding in gebruik; dat is gunstig.

Opvallend is het grote aantal kalveren van Rivierduin Ebels Han (zijn spermavoorraad is inmiddels verbruikt)

De meest gebruikte blaarkopstieren (met tenminste 87%G) in 2024 - 2025 (1^e inseminaties):

Widar (zwart):	509
Rivierduin Ebels Han (rood):	459 > dit is opmerkelijk (één bedrijf kocht de hele resterende voorraad van Ebels Han op)
Den Duylse Favoriet (rood) :	459 > dit is opmerkelijk omdat Favoriet pas halverwege het boekjaar beschikbaar kwam

Deze drie stieren waren met 1427 inseminaties goed voor 35,1% van de 4065 eerste inseminaties met blaarkopsperma.

Aantal inseminaties over de jaren:

Aantallen 1 ^e inseminaties:										TOTAAL aantal inseminaties							
Rasgroep	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
Blaarkop Zwart	1.658	1.844	1.500	1.511	1.590	1.439	1.399	1.388	4.905	5.397	4.364	4.506	4.957	4.408	3.423	3.219	
Blaarkop Rood	2.407	2.323	2.484	2.242	2.384	2.286	2.093	2.156	7.487	6.690	7.838	7.452	7.598	6.583	5.966	5.195	
Totaal Blaarkop:	4.065	4.167	3.984	3.753	3.974	3.725	3.492	3.444	12.392	12.087	12.202	11.958	12.555	10.991	9.389	8.414	

Conclusie: het totaal aantal blaarkopinseminaties is in laatste jaren stabiel rond 12.000. Het totaal aantal blaarkopinseminaties is flink hoger dan in de laatste 20 jaar. Van het totaal aantal inseminaties met blaarkopsperma is maar liefst ruim 66% een herinseminatie. In 2013 was dat nog bij 58% het geval. Roodblaar wordt bij KI duidelijk meer gebruikt dan zwartblaar; deels hangt dat af van wat de afstamming van de ingezette stieren is.

Vergelijken we over de rassen heen, dan wordt Blaarkop aanmerkelijk meer gebruikt voor herinseminaties dan de andere rassen. Goede bevruchtingsresultaten en de meerwaarde van de kalveren spelen daarbij een rol. **Blaarkop is zeer populair** voor gebruik om (HF)koeien die slecht drachtig worden, drachtig te krijgen zijn. Een vraag daarbij is of specifiek enkele blaarkopstieren voor dat doel gebruikt worden, en of dat ten koste gaat van het uiteindelijke aantal dochters dat aan de melk komt.

Wel heeft het een positieve invloed in te vriezen aantal doses (per stier) en het aantal in te zetten stieren per jaar.

Uitgaande van maximaal 3000 doses per stier, kunnen / moeten er ieder jaar tenminste vier nieuwe KI-stieren ingezet worden.

Wij spreken de wens uit dat ook de blaarkopkruislingen door melkveeouders met HF opgefokt worden tot melkkoe.

Aandachtspunt: jaarlijks worden helaas nog wat DHZ-inseminaties en dekkingen niet of niet tijdig geregistreerd.

Dit heeft ook effect op het aantal geboren stamboekkalveren.